



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

Број: 04-1135/6
Датум: 23.07.2025.

Дом здравља Врбас
Директору

Предмет: Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији општине Врбас

Поштовани,

Овим путем Вас информишемо да је у оквиру рутинског надзора над грозницом Западног Нила међу становништвом на територији општине Врбас регистрован један лабораторијски потврђен случај неуроинвазивне форме ове болести. Како је ово први лабораторијски потврђен случај на територији Врбаса укратко Вас подсећамо на основне карактеристике ове болести као и мере превенције.

Грозница западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом комарца. Главни вектор (преносилац) је врста комарца одомаћена код нас *Culex ripiens*. Симптоми ГЗН настају 3 до 14 дана након убода зараженог комарца. Код око 80% инфицираних особа болест протиче без икаквих симптома. Око 20% заражених особа има благу клиничку слику у виду грознице, главобоље, мучнине, повраћања, што понекад може да буде праћено отоком лимфних жлезда или појавом осипа на кожи груди, леђа или стомака. Обично поменути симптоми пролазе у року од пар дана, мада су забележени случајеви када је обољење трајало и више недеља. Код једног оболелог на 150 инфицираних долази до развоја тешке клиничке слике, односно неуроинвазивног облика болести са упалом мозга и/или можданица. Особе старије од 50 година живота имају већи ризик од настанка неуроинвазивног облика болести и требало би да обавезно спроводе мере превенције против убода комараца. Присутна хронична обољења, као што су имуносупресија, дијабетес и обољења кардиоваскуларног система, могу да буду независни фактори ризика за појаву тежег облика болести.

Молимо Вас да лекаре подсетите на клиничку слику ове болести и да сваки случај сумње на ГЗН упутите надлежном инфектологу.

Превентивне мере за спречавање настанка ове болести су:

1. Систематско и организовано запрашивање комараца - дезинсекција.
2. Редукција броја комараца на отвореном - исушивањем извора стајаће воде и елиминисањем места на која се склањају комарци и на којима полажу јаја.
3. Редукција броја комараца у затвореном простору.
4. Препоручује се употреба заштитних мрежа или комарника на вратима и прозорима, тако да комарци не могу да продру у затворен простор.
5. Мере личне заштите - Већина комараца је активна у зору и сумрак, па треба избегавати боравак ван куће у овом периоду уколико је то могуће. Потребно је користити репеленте (нпр. Аутан) током боравка на отвореном, уз истовремено ношење одеће са дугачким рукавима и ногавицама.

Горе наведене опште превентивне мере могу се ставити на сајт ваше установе и користити за здравствено-васпитни рад са становништвом.

О даљем развоју епидемиолошке ситуације грознице Западног Нила на територији Врбаса ћемо Вас правовремено извештавати.

Доц др Снежана Медић

Dr. S. Medić
Шеф Одсека за епидемиолошки надзор,
контролу и превенцију зооноза,
векторских и цревних заразних болести



Проф. др Миољуб Ристић

Начелник Центра за контролу и
превенцију болести